

ÉRYTHÈME INFECTIEUX

Informations sur les agents pathogènes chez l'homme – L'hygiène protège !

Qu'est-ce que l'érythème infectieux ?

L'érythème infectieux est dû à un virus. Avec la scarlatine, la varicelle, la rougeole et la rubéole, il fait partie des cinq maladies infantiles hautement contagieuses pouvant présenter des éruptions cutanées. Notez que la rubéole n'a rien à voir avec l'érythème infectieux, même si les symptômes se ressemblent. Ces deux maladies sont provoquées par des agents pathogènes différents. Les virus de l'érythème infectieux (Parvovirus B19) sont répandus dans le monde entier, uniquement chez l'homme. En règle générale, l'érythème infectieux peut passer inaperçu ou être confondu avec une infection grippale. Si une femme enceinte a un érythème infectieux, l'enfant à naître risque d'avoir des séquelles. La maladie a tendance à proliférer dans les maternités et les écoles, notamment entre la fin de l'hiver et le début de l'été. La maladie est contagieuse uniquement pour les personnes n'ayant encore jamais eu d'érythème infectieux. Une fois que l'on a eu cette maladie, on est immunisé à vie. On n'attrape donc cette maladie qu'une seule fois dans sa vie.

Comment l'érythème infectieux se transmet-il ?

D'homme à homme

Lorsque le patient éternue, tousse ou parle, il expectore des virus qui volent dans l'air dans de fines gouttelettes. Les virus peuvent se transmettre par les mains, lorsque le patient éternue dans sa main puis serre une main. Les agents pathogènes sont ainsi transmis de la main aux muqueuses du nez et de la bouche et contaminent ainsi la personne suivante.

Les femmes enceintes peuvent contaminer l'enfant qu'elles portent, qu'elle développe les symptômes de la maladie ou que la pathologie passe inaperçue. L'enfant à naître est particulièrement exposé.

Par les objets contaminés

Les agents pathogènes sont très résistants à l'air libre. Des objets contaminés tels que les poignées de portes ou les jouets sont des foyers d'infection pouvant propager la maladie.

Par les réserves de sang

Dans de très rares cas exceptionnels, il est possible de contaminer lors d'une transfusion avec du sang contaminé.

Quels sont les symptômes de la maladie ?

Il arrive souvent que l'érythème infectieux passe inaperçu et se déroule comme une légère grippe, avec une fièvre légère, une inflammation des ganglions et un sentiment de malaise. 15 à 20 % des personnes contaminées présentent l'éruption cutanée typique. 2 semaines après contamination, le patient présente des rougeurs symétriques sur les deux joues. Un peu plus tard, il présente des tâches rouges en forme de guirlande ou de dentelle sur les épaules, les bras, les cuisses et le postérieur, sans démangeaison et sans douleur. L'éruption peut évoluer et s'atténuer au bout de 7 à 10 jours.

Les *complications* sont très rares. En règle générale, l'érythème infectieux disparaît de lui-même. Il arrive rarement que le patient développe des douleurs ou des inflammations aux articulations, notamment chez les jeunes femmes et les filles. Chez les personnes souffrant d'une déficience immunitaire ou de certaines maladies sanguines (thalassémie, anémie à cellules falciformes), la maladie peut parfois provoquer une anémie sévère.

Quand la maladie se déclare-t-elle et combien de temps est-elle contagieuse ?

La période d'incubation, entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, est de 2 semaines (7 à 21 jours). Le risque de contamination est le plus élevé quelques jours avant l'apparition de l'éruption cutanée, le patient ne sachant pas encore qu'il a été infecté. Une fois l'apparition de l'éruption cutanée, le patient n'est en général plus contagieux. Même si l'érythème se déroule sans aucun symptôme visible, le patient reste contagieux.

Qui est particulièrement vulnérable ?

Cette maladie touche surtout les enfants âgés de 5 à 15 ans. Les jeunes et adultes peuvent également être contaminés. En règle générale, les maladies bénignes pour les enfants sont souvent plus graves chez l'adulte.

ÉRYTHÈME INFECTIEUX

Informations sur les agents pathogènes chez l'homme – L'hygiène protège !

Qui est particulièrement vulnérable ?

Les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes qui n'ont pas encore eu d'érythème infectieux et n'ont par conséquent pas d'anticorps contre l'érythème infectieux. Pendant la grossesse, et plus particulièrement pendant le premier tiers de la grossesse, le virus peut être transmis au bébé. Cela peut sévèrement endommager la formation du sang de manière irréversible. Dans le pire des cas, cela peut déclencher une fausse couche ou tuer le bébé.

Les personnes souffrant de déficience immunitaire ou d'une maladie sanguine chronique sont également vulnérables.

Que faire en cas de contamination ?

- ▶ En règle générale, il n'est pas nécessaire de traiter les symptômes de la maladie, puisque celle-ci se déroule généralement sans complications. En cas de fièvre, de douleurs musculaires ou articulaires, le patient devra observer un repos strict.
- ▶ Les personnes malades doivent éviter d'éternuer ou de tousser dans la main. Il est préférable d'utiliser des mouchoirs en papier qu'elles jetteront après utilisation. Ensuite, il faut se laver les mains.
- ▶ Les femmes enceintes et les patients souffrant d'une déficience immunitaire ayant été en contact avec une personne atteinte d'érythème infectieux doivent immédiatement consulter un médecin.
- ▶ Le personnel de collectivités pour enfants et d'écoles doit être informé dès le départ des éventuels risques en cas d'érythème infectieux.
- ▶ Certaines régions allemandes conseillent une interdiction de travail dans les collectivités pour enfants en bas âge pour les femmes enceintes n'ayant pas de protection contre l'érythème infectieux.

Comment me protéger ?

Il est très difficile de se protéger de l'érythème infectieux, car le risque de contamination est au plus fort avant l'apparition des symptômes. Contrairement à la rubéole, il n'existe pas de vaccin contre l'érythème infectieux. L'érythème infectieux se transmet par les fines gouttelettes de salive et par les mains. Il est donc possible de réduire les risques de contamination autour des patients.

Ainsi, par exemple :

- ▶ Évitez tout contact avec des personnes qui pourraient être contaminées.
- ▶ Lavez-vous souvent et soigneusement les mains à l'eau et au savon !
- ▶ Évitez de vous frotter le visage, notamment la bouche, le nez et les yeux, sans vous être lavé les mains.
- ▶ Les femmes enceintes qui n'ont jamais eu d'érythème infectieux doivent éviter les établissements scolaires en cas d'épidémie d'érythème infectieux.
- ▶ Avant toute grossesse, faites-vous tester pour déterminer si vous êtes immunisée contre l'érythème infectieux, en particulier si vous êtes en contact avec des enfants de maternelle ou en âge scolaire.

Où puis-je m'informer ?

L'administration de santé locale se tient à votre disposition pour toute question. Elle vous fournira des informations et dispose d'une grande expérience en la matière.

Vous trouverez plus d'informations sur cette maladie sur les pages des pédiatres en ligne (www.kinderaerzte-im-netz.de).

Vous trouverez des informations sur la protection contre les infections sur la page du Centre fédéral pour l'éducation à la santé, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.infektionsschutz.de).



STEMPEL

Éditeur :

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Cologne.
Tous droits réservés.

Rédigé en collaboration avec le Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.

(fédération allemande des médecins de la santé publique)

Ces informations publiques peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur le site web

www.infektionsschutz.de.

