




Календар щеплень на 2022 рік: які щеплення рекомендовані?

Рекомендації Постійної комісії з вакцинації (Ständige Impfkommission, STIKO), станом на січень 2022 року

 Немовлята та малі діти
(2–23 місяці)

 Діти та підлітки
(2–17 років)

 Дорослі
(з 18 років)

Щеплення	6 тижнів	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	Від 18	Від 60					
Ротавіруси	G1 ^a		G2	(G3)																			
Правець		6-разове щеплення	N	6-разове щеплення	N	6-разове щеплення	N					A1	N	A2		N	A Кожні 10 років						
Дифтерія							N					A1	N	A2	N	A Кожні 10 років							
Коклюш (Pertussis)							N					A1	N	A2	N	A3 ^e N							
Hib (Haemophilus influenzae Typ b (гемофільна інфекція типу «b»))																							
Поліомієліт (Poliomyelitis)												N						A	N				
Гепатит В							N																
Пневмококи		G1 ^b	N	G2	N	G3 ^c	N											S ^g					
Менінгококи С							G1	N															
Кір						3-разове щеплення MMR	N			3-разове щеплення MMR + вітряна віспа	N							S ^f					
Епідемічний паротит							N				N												
Краснуха							N				N												
Вітряна віспа (Varicella)						G1	N			G2	N												
HPV (Humane Papillomviren (вірус папіломи людини))														G1 ^d +G2 ^d	N								
Оперізувальний лишай (Herpes Zoster)																		G1 ^h +G2 ^h					
Грип (Influenza)																		S Щорічно					

Особі віком від 6 місяців із хронічними захворюваннями (щорічно), а також вагітні жінки

- J** Щеплення під час профілактичного огляду підлітків
- U** Щеплення під час профілактичного огляду дітей
- N** Додаткове щеплення (в разі неповного вакцинного захисту)
- A** Ревакцинація
- G** Первинна вакцинація (до чотирьох часткових вакцинацій G1–G4)
- S** Стандартна вакцинація

- a** перше щеплення можливе з віку 6 тижнів, у залежності від вакцини – 2 або 3 пероральні вакцинації (G2/G3) з мінімальним інтервалом 4 тижні
- b** недоношені діти отримують додаткове щеплення у віці 3 місяці (загалом 4 вакцинації)
- c** мінімальний інтервал від попереднього щеплення: 6 місяців
- d** 2 щеплення (з інтервалом мінімум 5 місяців) для дівчат і хлопців у віці від 9 до 14 років; у разі додаткового щеплення починаючи з віку 15 років, а також при інтервалі менше 5 місяців між двома щепленнями потрібне третє щеплення
- e** одноразова ревакцинація, можлива з наступним щепленням від правця / дифтерії / за необхідності поліомієліту

- f** одноразова вакцинація всіх народжених після 1970 року дорослих, які мають нез'ясований вакцинний захист, не вакцинувалися взагалі або вакцинувалися лише в дитинстві
 - g** вакцинація т. зв. полісахаридною вакциною
 - h** дворазове щеплення інактивованою вакциною з інтервалом мінімум 2 і максимум 6 місяців
- * Вакцинації можуть розподілятися на декілька щеплень. MMR-щеплення та щеплення від вітряної віспи можна проводити в один день або з інтервалом 4 тижні.



Актуальну інформацію про профілактичне щеплення від коронавірусу можна знайти на нашій сторінці [infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)