

Impfkalender 2023 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand September 2023

Säuglinge und Kleinkinder
(2–23 Monate)

Kinder und Jugendliche
(2–17 Jahre)

Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	U4 2	U4 3	4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus		G1 ^b		G2		G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre
Diphtherie		G1 ^b		G2		G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre
Keuchhusten (Pertussis)		G1 ^b		G2		G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A3 ^e N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1 ^b		G2		G3 ^c	N											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1 ^b		G2		G3 ^c	N							A		N		
Hepatitis B		G1 ^b		G2		G3 ^c	N											
Pneumokokken		G1 ^b		G2		G3 ^c	N											S ^g
Meningokokken C							G1	N										
Masern						G1	N		G2	N								S ^f
Mumps						G1	N		G2	N								
Röteln						G1	N		G2	N								
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N								
HPV (Humane Papillomviren)													G1 ^d +G2 ^d	N				
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 ^h +G2 ^h
Grippe (Influenza)					Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und Schwangere												S jährlich	
COVID-19					Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen und Schwangere												G1 ⁱ +G2 ⁱ A1 ⁱ A jährlich ^j	

- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- S** Standardimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
 - b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
 - c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate
 - d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich
 - e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
 - f** einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
 - g** Impfung mit sogenanntem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV20)
 - h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
 - i** Impfabstände entsprechend Fachinformation beachten (zwischen G1 und G2 sowie G2 und A1)
 - j** Wiederholte Auffrischimpfung mit Mindestabstand von 12 Monaten zum letzten Antigenkontakt, vorzugsweise im Herbst. Personen ab 6 Monaten mit chronischen Erkrankungen wird ebenfalls eine jährliche Auffrischimpfung empfohlen.
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



Aktuelle Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf unserer Seite www.impfen-info.de