



# Yeni doğanlar ve küçük çocuklar için RSV profilaksisi: En önemli bilgilere genel bakış



## RSV profilaksisi nedir?

**RSV profilaksisi RV virüsüne karşı pasif bir bağışıklamadır.** Bu yöntemde virüsün insan vücudunda yayılmasını zorlaştırmak için uyluğa savunma maddeleri enjekte ediliyor. Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Haziran 2024'ten bu yana tüm yeni doğanlara ve ilk RSV sezonunda olan bebeklere Nirsemivab (Ticari adı: Beyfortus) etken maddeli RSV profilaksisi öneriyor



## RSV nedir?

RSV respiratuar sinsityal virüsü temsil eder. RSV, solunum yollarını saran bir virüsdür ve özellikle öksürük, hapsirme ve konuşma sırasında saçılan damlacıklarla aktarılır. Temas yoluyla da aktarılabilir. RSV sezonu genellikle ekimden marta kadar sürer.

- Tüm küçük çocukların **%70 kadarı** hayatlarının ilk sonbaharında veya kışında RSV ile enfekte olur.
- **Neredeyse tüm** çocuklar hayatlarının ilk iki yılında RSV ile enfekte olur.

Hafif seyirlerde hastalık belirtileri soğuk algınlığı gibi kendini gösterir. Ağır seyirlerde ise alt solunum sollarının iltihaplanması ("bronşit") veya zatürre meydana gelebilir. Ayrıca bir RSV enfeksiyonu orta kulak iltihabının da en yaygın nedenidir. Hastalık seyri ağır olan küçük çocuklar sıklıkla hastanede tedavi edilmelidir. Ender vakalarda hastalığın seyri ölümlü de sonuçlanabilir.



## Neden RSV profilaksisi öneriliyor?

**RSV profilaksisi bir RSV hastalığının ağır seyretme riskini azaltır.** Bu sayede bir RSV profilaksisi sonrasında hasta küçük çocukların daha nadir hastanede tedavi edilmesi gerekir.

**8 aylıktan küçük 1.000 bebek** arasından şu kadarının bir RSV hastalığı nedeniyle hastanede tedavi edilmesi gerekir:



Profilaksisiz: 35



Profilaksili: 7

Ağır hastalık seyirlerinin azalması, sonbahar ve kış aylarında çocuk muayenehaneleri ve hastaneler üzerindeki yükü hafifletebilir. Bu tür bir rahatlatma tüm çocukların tıbbi bakımını iyileştirir.



## RSV profilaksisi ne zaman uygulanmalı?

**RSV profilaksisi, hayatlarındaki ilk RSV sezonunda olan tüm yeni doğanlara ve küçük çocuklara tavsiye edilir.** Zamanlama doğum ayına göre belirlenir:

- Nisan ile Eylül ayları arasında doğan küçük çocuklarda RSV profilaksisi **Eylül ile Kasım arasında** (yani 1. RSV sezonunda) uygulanmalıdır.
- Ekim ile Mart ayları arasında doğan küçük çocuklarda RSV profilaksisi **doğumdan sonra mümkün olduğunca erken yapılmalıdır**, genelde doğumhaneden çıkarken veya U2 muayenesinde (3-10 günlükken). Kaçırılan bir dozun RSV sezonu içinde mümkün olduğunca erken telafi edilmesi gerekir.



Profilaksi Eylül ile Ekim arası



Profilaksi doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede



## Koruma etkisi ne kadar süre gider?

**RSV profilaksisinin koruma etkisi etken maddenin verilmesinden hemen sonra başlar** genelde tüm RSV sezonu boyunca devam eder. Bu nedenle tek bir doz ilk RSV sezonunda bir koruma için yeterlidir.



## RSV profilaksisi güvenli mi?

**RSV profilaksisi iyi tolere edilir.** Çeşitli çalışmalar bunu gösteriyor. Uygulamadan sonra aşı yerinde ağrı veya geçici döküntü gibi reaksiyonlar meydana gelebilir. Daha nadiren etken maddeye alerjik reaksiyonlar da oluşabilir. Tolere edilebilirlik ve güvenlik sürekli araştırılıyor.