



Профілактика РСВ для новонароджених і немовлят: огляд найважливішої інформації



Що таке профілактика РСВ?

Профілактика РСВ — це пасивна імунізація проти **РС-вірусу (респіраторно-синцитіальний вірус)**. Для її здійснення роблять ін'єкцію у стегно і вводять захисні речовини, які заважають вірусу поширюватися в організмі людини. Із червня 2024 року Постійний комітет із вакцинації (STIKO) рекомендує проводити профілактику РСВ всім новонародженим і немовлятам під час їх першого сезону РСВ, використовуючи діючу речовину нірсевімаб (торгове найменування: Veufortus).



Що таке РСВ?

РСВ — це скорочення від «респіраторно-синцитіальний вірус». Вірус РСВ уражає дихальні шляхи та насамперед передається повітряно-крапельним шляхом під час кашляння, чхання чи розмови. Також можлива його передача через поверхні. Як правило, сезон РСВ триває із жовтня по березень.

- До 70 % всіх немовлят заражаються вірусом РСВ у першу осінь або зиму свого життя.
- Упродовж перших двох років життя вірусом РСВ заражаються майже всі діти.

У випадку легкого перебігу симптоми захворювання подібні до симптомів застуди. У випадку важкого перебігу може виникнути запалення нижніх дихальних шляхів («бронхіоліт») або запалення легенів. Крім того, зараження РСВ є частою причиною запалення середнього вуха. Немовлята з важким перебігом захворювання часто потребують лікування у лікарні. У рідкісних випадках можливий перебіг зі смертельним наслідком.



Чому рекомендується профілактика РСВ?

Профілактика РСВ зменшує ризик важкого перебігу захворювання РСВ. Тому після профілактики РСВ немовлят рідше доводиться лікувати у лікарні.

Із 1000 немовлят віком до 8 місяців лікувати РСВ-захворювання у лікарні довелося:



Зменшення випадків важкого перебігу захворювання може розвантажити педіатричні кабінети та лікарні восени та взимку. Таке розвантаження може покращити медичне обслуговування всіх дітей.



Коли потрібно проводити профілактику РСВ?

Профілактика РСВ рекомендується всім новонародженим і немовлятам під час їх першого сезону РСВ. Момент введення залежить від місяця народження:

- Для немовлят, які народилися із квітня по вересень, профілактику РСВ потрібно проводити із **вересня по листопад** (тобто перед початком їх першого сезону РСВ).
- Для немовлят, які народилися із жовтня по березень, бажано провести профілактику РСВ **якомога раніше після народження**, як правило, під час виписки з пологового будинку або під час профілактичного обстеження U2 (із 3-го по 10-й день життя). Пропущене введення бажано надолужити якомога раніше під час сезону РСВ.

Місяць народження

Квітень —
вересень



профілактика із вересня по листопад

Місяць народження

Жовтень —
березень



Профілактика якомога раніше після народження



Як довго тримається захисна дія?

Захисна дія профілактики РСВ починається безпосередньо після введення діючої речовини та зазвичай тримається протягом всього сезону РСВ. Тобто одноразового введення достатньо для захисту в перший сезон РСВ.



Чи є профілактика РСВ безпечною?

Профілактика РСВ добре переноситься організмом. Це показали численні дослідження. Після введення можуть з'явитися реакції у місці ін'єкції, наприклад, болі або тимчасове висипання. Рідше можуть виникати алергічні реакції на діючу речовину. Переносимість і безпека постійно досліджуються.